

**PREVENTION ET PRISE EN CHARGE INITIALE DE  
L'HEMORRAGIE DU POST-PARTUM IMMEDIAT**

**ANNEE 2014**

Secteurs :  
Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)  
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)  
Soins de Longue Durée (SLD)

Mots clés	Intitulé	Description	Secteur	Résultat	
Prévention de l'hémorragie après un accouchement*	Prévention de l'hémorragie lors de la délivrance après un accouchement	Cet indicateur évalue si la modalité de la délivrance, la réalisation d'une injection prophylactique d'ocytocine et le contrôle de l'état du placenta ont été notés dans le dossier de la patiente	MCO	97/100*	A
Surveillance clinique après un accouchement*	Surveillance clinique minimale en salle de naissance après un accouchement	Cet indicateur évalue la surveillance clinique minimale dans les 2 heures qui suivent l'accouchement et l'examen autorisant la sortie de la patiente de la salle de naissance	MCO	72/100*	B
Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat*	Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat	Cet indicateur évalue si l'heure du diagnostic, le volume de sang perdu et la réalisation d'au moins un geste endo-utérin sont notés dans le dossier de la patiente	MCO	58/100*	C

**A** **B** **C** La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d'une logique de secteur (source : QUALHAS).

\*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement